

PANAVET®

Salud Animal

Guía Rápida



Antibióticos

Ampi Estrep con Flumetasona®

Antibióticos de amplio espectro con antiinflamatorio esteroide (AIE)
Ampicilina sódica y trihidratada, Estreptomicina, Flumetasona



Reg. Q-0296-033

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida: IM profunda. 1 ml/ 7.5 kg p.v./ 12-24 h/ 3-5 d.

Presentación: Polvo para suspensión inyectable. 1 g: Frasco con polvo + 20 ml. 2 g: Frasco con polvo + 40 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 30 d. Leche: 60 h.

Ampicilina Panavet®

Antibiótico de amplio espectro
Ampicilina



Reg. Q-0296-013/ 84

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida:

IM profunda, IV y SC. 250 mg: 1 ml/ 10 kg p.v./ 12 h/ 3-5 d. 500 mg y 1 g: 1 ml/ 25 kg p.v./ 12 h/ 3-5 d.

Presentación: Polvo para suspensión inyectable. Frasco con 250 mg + Frasco con 2 ml diluente. Frasco con 500 mg ó 1 g polvo + Frasco con 2 ó 4 ml diluente respectivamente.

Tiempo de retiro: Carne: 25 d. Leche: 96 h.

Ceftiopan® 50 RTU

Cefalosporina 3^a. gen.
sin tiempo de retiro en leche
Ceftiofur



Reg. Q-0296-074

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos y ovinos.

Administración y dosis sugerida:

IM profunda. **Bovinos:** 1 -2 ml. **Equinos:** 2.2 ml. **Porcinos:** 1-3 ml. **Ovinos:** 1.1 -2.2 ml/ 24 h/ 3-5 d.

Presentación: Suspensión inyectable. Frasco con 25, 100 ó 250 ml.

Tiempo de retiro: : 24 h. Leche: 0 h.

Diclofepan® 6 MUI

Combinación Penicilinas corta y larga acción (LA)
+ AINE
Penicilina G Benzatínica, G Procaína, G Potásica, Estreptomicina, Diclofenaco



Reg. Q-0296-090

Especies: Bovinos productores carne y leche, equinos, porcinos, caprinos y ovinos.

Administración y dosis sugerida: IM profunda. 1 ml/ 40 kg p.v./ 72 h/ 2 aplicaciones.

Presentación: Frasco con polvo + frasco 15 ml diluente.

Tiempo de retiro: Carne: 30 d. Leche: 72 h.

Floxapana®

Antibiótico amplio espectro
Tratamiento
Mycoplasma spp
Enrofloxacina 5%



Reg. Q-0296-053

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida:

SC, IM e IV lenta. **Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos:** 1 ml/ 10-20 kg p.v. **Caninos domésticos:** 1 ml/ 5-10 kg p.v. **Felinos domésticos:** 1 ml/ 10 kg p.v. 24 h/ 3-5 d.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 20 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 28 d. Leche: No recomendado en producción.

Floxapana® 10%

Antibiótico amplio espectro
Tratamiento
Mycoplasma spp
Enrofloxacina 10%



Reg. Q-0296-089

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida: SC e IM. **Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos:** 1 ml/ 40 kg p.v.

Caninos y felinos domésticos: 1 ml/ 20 kg p.v./ 24 h/ 3-5 d.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 100 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 28 d.

Antisépticos

Panaflor®

Tratamiento integral para infecciones respiratorias
Florfénicol 30%, Bromhexina, Diclofenaco



Reg. Q-0296-088

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos y caprinos.

Administración y dosis sugerida:

IM profunda. **Bovinos:** 1 ml/ 15 kg p.v. **Porcinos, ovinos y caprinos:** 1 ml/ 20 kg p.v./ 48 h/ 2 aplicaciones.

Presentación: Solución inyectable.

Frasco con 250 ml.

Tiempo de retiro: Bovinos, ovinos y caprinos: 30 d. Porcinos: 18 d. Leche: No se recomienda durante la producción.

Oxitetraciclina Panavet®

Antibiótico de amplio espectro
Oxitetraciclina 5%



Reg. Q-0296-078

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos y ovinos.

Administración y dosis sugerida: SC, IM, IV, Intraperitoneal, Intrauterina y Tópica. 1 ml/ 5-20 kg p.v./ 24 h/ 3-5 d.

Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 100 ó 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 30 d. Leche: 24 h.

Viogel®

Antiséptico, desinfectante y auxiliar de la cicatrización
Alcohol, Ácido Tálico, Genciana



Reg. Q-0296-001

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida: Tópica. Aplicar generosamente en el área afectada. 8 h/ A criterio del MV.

Presentación: Envase plástico con o sin atomizador con 1 l, ó con aplicador con 100 ml.

Tiempo de retiro: No aplica.

Control de la Diarrea

Diastopan®

Nutracéutico
antidiarréico
Psyllium (Plántano), Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, Na⁺, K⁺



Reg. Q-0296-060

Especies: Bovinos productores de carne y leche (becerros).**Administración y dosis sugerida:** Oral. Dosis sugerida: 75 g disueltos en 1.5 l agua/ 35-75 kg p.v./ 12 h/ 2 d.**Presentación:** Polvo oral soluble. Cubeta 2.4 kg con dosificador ó 20 sobres x 75 g.**Tiempo de retiro:** Carne y leche: 0 h.

Control del Dolor

Flumetasona Panamericana

Antiinflamatorio
Esteroidal (AIE)
Flumetasona



Reg. Q-0296-042

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.**Administración y dosis sugerida por paciente:** IM, IV e Intraarticular. **Bovinos:** 2.5 – 10 ml. **Equinos:** 2.5 – 5 ml. **Ovinos y caprinos:** 1-2 ml. **Porcinos:** 0.25 – 5 ml/ 48 h/ 2 aplicaciones.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco con 10 ml.**Tiempo de retiro:** Carne: 7 d. Leche: 3 d.

Fluxymeg® Panavet ®

Antinflamatorio No
esteroidal (AINE)
Flunixin Meglumina



Reg. Q-0296-075

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos y caninos domésticos.**Administración y dosis sugerida:** IM e IV lenta. 1-2 ml/ 50 kg p.v./ 24 h/ 2-5 d.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco con 20, 100 ó 250 ml.**Tiempo de retiro:** Carne: 4 d. Leche: 96 h.

Control del Tracto Respiratorio

Expectorante Broncodilatador

Mucolítico,
antitusígeno y
descongestionante de
las vías respiratorias
**Guaiacol, Gomenol,
Eucaliptol, Alcanfor**



Reg. Q-0296-014

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.**Administración y dosis sugerida por paciente:** IM. Profunda. **Bovinos:** 10-20 ml. **Porcinos, ovinos y caprinos:** 5-10 ml. **Caninos y felinos domésticos:** 3-6 ml/ 12-24 h/ 3-5 d.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco con 50 ó 100 ml.**Tiempo de retiro:** Carne: 36 h. Leche: 72 h.

Correctores Metabólicos

Amino-Vit®

Reconstituyente
energético con
vitaminas, aminoácidos
y minerales
**Aminoácidos,
Dextrosa, Vitaminas
del complejo B, Na⁺,
Mg⁺, K⁺**



Reg. Q-0296-065

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.**Administración y dosis sugerida:** Oral, SC, Intraperitoneal e IV. 2-10 ml/ kg p.v./ 8-12 h/ 1-3 d.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco plástico con 500 ml.**Tiempo de retiro:** Carne y leche: 0 h.

Anemin-Phos®

Reconstituyente,
estimulante del apetito y
regulador del
metabolismo. Prevención y
tratamiento de
hipofosfatemias.
Fosforilcolamina,
Vitaminas ADB,
Gluconato de Hierro



Reg. Q-0296-066

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.**Administración y dosis sugerida por paciente:**IM profunda. **Bovinos:** 20-30 ml. **Becerro:** 10 ml. **Equinos:** 10-15 ml. **Ovinos y caprinos:** 3-6 ml/ 48 h/ 3 aplicaciones.**Porcinos (hembras):** 25 ml/ 48 h/ 2 aplicaciones. **Lechones:** 1-2 ml/ DU.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco con 100 ó 250 ml.**Tiempo de retiro:** Carne y leche: 0 días.

Calciprotein® Fuerte

Calcio 50% acción
inmediata con aporte
energético y
vitamínico
Gluconato de Ca,
Glucosa, Mg⁺,
Aminoácidos,
Vitaminas Complejo B



Reg. Q-0296-061

Especies: Bovinos productores de carne y leche, terneros, equinos, potros, porcinos, ovinos, caprinos, lechones y caninos domésticos.**Administración y dosis sugerida por paciente:** SC, IM profunda e IV lenta. **Bovinos y equinos:** 90-125 ml. **Terneros, potros, porcinos, ovinos y caprinos:** 20-30 ml. **Lechones y caninos domésticos:** 2-3 ml. A criterio del MV.**Presentación:** Solución inyectable. Frasco plástico con 100 ó 250 ml.**Tiempo de retiro:** Carne y leche: 24 h.

PANAVET®

Salud Animal

Desparasitantes

Calciprotein® Vitaminado

Calcio 24% acción inmediata con aporte energético y vitamínico
Gluconato de Ca,
Glucosa, Mg⁺, Na⁺,
Aminoácidos,
Vitaminas Complejo B



Reg. Q-0296-018

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, lechones y caninos domésticos.

Administración y dosis sugerida por paciente: IM profunda e IV lenta. **Bovinos y equinos:** 200-250 ml. **Ovinos y caprinos:** 15-30 ml. **Porcinos:** 50-150 ml. **Lechones:** 5 ml. **Caninos domésticos:** 5-10 ml. A criterio del MV.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 100, 250 ó 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 24 h.

Closantel Panavet® 5% Oral

Fasciolicida,
Antihelmíntico y
antinematodo.
Closantel 5%



Reg. Q-0296-059

Especies: Bovinos productores de carne y leche, ovinos y caprinos.

Administración y dosis sugerida: Oral. Prevención: 2ml/10 kg p.v./ DU. Infestaciones graves o crónicas: 5 ml/10 kg p.v.

Presentación: Solución oral. Envase plástico con 100, 250 ó 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 65 días.

Calciprotein® Vitaminado Rx

Calcio 16% acción inmediata con aporte energético y vitamínico
Gluconato de Ca,
Glucosa, Mg⁺,
Aminoácidos,
Vitaminas Complejo B



Reg. Q-0296-019

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, lechones y caninos domésticos.

Administración y dosis sugerida por paciente: IM profunda e IV lenta. **Bovinos y equinos:** 250-500 ml. **Ovinos y caprinos:** 30-60 ml. **Porcinos:** 100-200 ml. **Lechones:** 5-10 ml. **Caninos domésticos:** 10-30 ml. A criterio del MV.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 24 h.

Anapiro®

Profilaxis y tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis.
Oxitetraciclina,
Diaceturato



Reg. Q-0296-002

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Administración y dosis sugerida: IM. 2x1 g: 1 frasco hasta los 300 kg p.v./ 24 h/ 3 d. 3x1.5 g: 1 frasco más de 300 kg p.v./ 24 h/ 3 d.

Presentación: Polvo y diluente para suspensión inyectable. Frascos con polvo + frasco con diluente.

Tiempo de retiro: Carne: 30 d. Leche: 60 h.

Dectopan®

iNUEVO!

Endectoparasitida
Doramectina 1%



Reg. Q-0296-069

Especies: Bovinos y ovinos productores de carne y porcinos.

Administración y dosis sugerida: SC. Bovinos y ovinos: 1 ml/ 50 kg p.v. Porcinos: 1 ml/ 33 kg p.v./ 42 d.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 50, 100 ó 250 ml.

Tiempo de retiro: 50 días, Porcinos: 28 días, Ovinos: 70 días. Leche: No administrar este producto durante la producción láctea.

Imidopan-B12®

Profilaxis y tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis (Babesiosis)
Imidocarb, Vitamina B₁₂



Reg. Q-0296-080

Especies: Bovinos productores de carne y leche y ovinos.

Administración y dosis sugerida: IM profunda. **Piroplasmosis:** 1 ml/ 100 kg p.v. **Piroplasmosis + Anaplasmosis:** 2.5 ml/ 100 kg p.v./ DU.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 10 ó 100 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 28 d. Leche: No se recomienda durante la producción.

Iver-pan® al 1%

Endectoparasitida
Ivermectina 1%



Reg. Q-0296-069

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, y ovinos.

Administración y dosis sugerida: SC. Bovinos y ovinos: 1 ml/ 50 kg p.v. Porcinos: 1 ml/ 33 kg p.v./ 15-30 d.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 10 ó 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 28 d. Leche: No se recomienda durante la producción.

Iverpan®-ADE

Endectoparasitida con Vitaminas ADE
Ivermectina 1%,
Vitaminas ADE



Reg. Q-0296-079

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos y caprinos.

Administración y dosis sugerida: SC. Bovinos y ovinos: 1 ml/ 50 kg p.v. Porcinos: 1 ml/ 33 kg p.v./ 15-30 d.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 10, 50, 100 ó 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 28 d.

Iverpan® Premium 3.15%

Endectoparasitida Larga Acción L.A.
Ivermectina 3.15%



Reg. Q-0296-082

Especies: Bovinos productores de carne y leche y ovinos.

Administración y dosis sugerida: SC. Bovinos y ovinos: 1 ml/ 50 kg p.v./ 3 meses.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico con 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 122 d. Leche: No se recomienda en producción.

L-Vermifugare® 12% inyectable



Antihelmíntico
Levamisol 12%

Reg. Q-0296-030

Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos y caprinos.

Administración y dosis sugerida por paciente: SC e IM profunda. **Parásitos gastrointestinales:** 1 ml/ 25 kg p.v. **Parásitos pulmonares:** 1 ml/ 20 kg p.v./ DU.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 500 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 72 h. Leche: 3 d.

Synco-Gen®



Análogo de
prostaglandina F_{2α}
Sincronizador del celo
Cloprostenol

Reg. Q-0296-083

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos y porcinos.

Administración y dosis sugerida por paciente: IM. **Bovinos:** 2 ml. **Equinos:** 1 ml. **Porcinos:** 0.7 – 1 ml/ A criterio del MV, del protocolo y/o la patología.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 20 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 48 h.

Tópico

Varec pomada®



Rubefaciente,
antiflúgostico y
antiséptico
**Guayacol, Salicilato
de Metilo, Ioduro de
Na, Lanolina, Iodo,
Alantoína**

Reg. Q-0296-010

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida por paciente: Tópica. Aplicar generosamente en el área afectada hasta la penetración. 12-24 h/ A criterio del MV.

Presentación: Tópica. Tarro plástico con 250 g.

Tiempo de retiro: No aplica.

Gonadogen®

iNUEVO!

Análogo sintético de
GnRH
Sincronizador del
celo
Gonadorelin

Reg. Q-0296-094



Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, caprinos y ovinos.

Administración y dosis sugerida por paciente: IM. **Bovinos:** 2 ml. **Porcinos, ovinos y caprinos:** 1 ml/ A criterio del MV, del protocolo y/o la patología.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 0 h.

Lactocin® 20

Estimulante de la
musculatura lisa

Oxitocina 20 UI



Reg. Q-0296-025

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida por paciente: SC, IM e IV. **Bovinos y equinos:** 5 ml. **Porcinos, ovinos y caprinos:** 1.5 – 2.5 ml. **Caninos domésticos:** 0.25-1.15 ml. **Felinos domésticos:** 0.25 ml – 0.5 ml/ DU.

Presentación: Solución inyectable. Frasco plástico 10 ó 250 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 15 d. Leche: 24 h.

Oftálmico

Gentoftal-Oftálmico



Antibiótico de amplio
espectro,
Antiinflamatorio
esteroidal
Gentamicina,
Dexametasona

Reg. Q-0296-077

Especies: Caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida: Oftálmica. 1-2 gotas en cada saco conjuntival/ 6 -12 h/ 7 d.

Presentación: Solución oftálmica. Frasco gotero con 10 ml.

Tiempo de retiro: No aplica.

Vitaminas y Minerales

Hierro Dextrán Panamericana



Aporte férreo para
becerros y lechones
neonatos.
Hierro dextrán 10%

Reg. Q-0296-037

Especies: Bovinos productores de carne y leche (becerros) y porcinos (lechones).

Administración y dosis sugerida por paciente: IM profunda. **Becerros:** 5 – 10 ml/ A criterio del MV. **Lechones:** 2 ml/ DU.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 20 ó 100 ml.

Tiempo de retiro: Carne: 0 h. Leche: No aplica.

Multivit-B



Suplemento
Vitamínico
Complejo B
Vitaminas
Complejo B

Reg. Q-0296-062

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

Administración y dosis sugerida por paciente: IM profunda. **Bovinos y equinos:** 5-10 ml. **Porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos:** 1-5 ml/ 24 h/ 3 aplicaciones.

Presentación: Solución inyectable. Frasco con 10, 25, 50 ó 100 ml.

Tiempo de retiro: Carne y leche: 0 h.

Grupos terapéuticos

Antibióticos

- Ampi Estrep con Flumetasone
- Ampicilina Panavet®
- Ceftiopan® 50 RTU
- Diclofepan®
- Floxapana®
- Floxapana® 10%
- Panaflor®
- Oxitetracilina Panavet®

Antisépticos

- Viogel®

Control de la Diarrea

- Diastopan®

Control del Dolor

- Flumetasona Panamericana
- Fluymeg® Panavet®

Control del Tracto Respiratorio

- Expectorante Broncodilatador

Control del Tracto Urinario

- Urosemid®

Correctores Metabólicos

- Amino-Vit®
- Anemin-Phos®
- Calciprotein® Fuerte
- Calciprotein® Vitaninado
- Calciprotein® Vitaninado RX

Desparasitantes

- Anapiro®
- Closantel Panavet® 5% Oral
- Dectopan® NUEVO
- Imidopan-B12®
- Iver-pan® al 1%
- Iverpan® ADE
- Iverpan® Premium 3.15%
- L-Vermifurgare® 12% inyectable

Hormonales

- Gonadogen® NUEVO
- Lactocin® 20
- Syncro-Gen®

Intramamarios

- Masti-pan®

Oftálmicos

- Gentoftal-Oftálmico

Tópicos

- Varec pomada®

Vitaminas y Minerales

- Hierro Dextrán Panamericana
- Multivit-B

Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V.
San Martín de Porres 107, Zona Ind. Felipe Carrillo Puerto.
Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.



📞 800.400.3000
✉️ panavet@panavet.com.mx
🌐 panavet.com.mx