

Flumetasona Panamericana

Reg. Q-0296-042

ISO 9001

Solución inyectable

Antiinflamatorio esteroide (AIE).

Fórmula

Cada ml contiene:

Flumetasona	0.5 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos y caprinos: Indicado en el tratamiento de estados inflamatorios con y sin componente alérgico.

Auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide, tendosinovitis, bursitis, reacciones anafilácticas e hipersensibilidad aguda.

Auxiliar en dermatosis con componente inflamatorio agudo o crónico particularmente las que presentan prurito.

Administración y Dosis

Vía IM, IV e Intraarticular.

Dosis sugerida:

Especies	Dosis por paciente	
	mg	ml
Bovinos productores de carne y leche	1.25 – 5 mg	2.5 – 10 ml
Equinos	1.25 – 2.5 mg	2.5 - 5 ml
Ovinos y caprinos	0.5 – 1 mg	1 - 2 ml
Porcinos	0.125 – 2.5 mg	0.25 - 5 ml

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones cada 48 horas, 1 a 2 ocasiones.

Control del Dolor

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# dosis por presentación*
Bovinos productores de carne y leche y equinos	10 ml	4 dosis
Ovinos y caprinos	10 ml	10 dosis
Porcinos	10 ml	40 dosis

* De acuerdo a dosis mínima sugerida.

Propiedades farmacológicas

Flumetasona Panamericana es un glucocorticoide de acción prolongada (~48 h) que actúa inhibiendo la producción de ácido araquidónico y por lo tanto de forma indirecta la producción de nuevos mediadores de la lipooxigenasa y ciclooxygenasa.

La distribución es amplia en todos los tejidos.

Se metaboliza en hígado y los metabolitos inertes solubles son eliminados vía renal.

Efectos secundarios y advertencias

Al igual que otros glucocorticoides, tiene efectos hiperglucemiantes e inmunodepresores, por lo que el uso de este producto debe ser prescrito siempre bajo supervisión médica.

Puede inducir retención de sodio y agua, lo que se expresa como poliuria y polidipsia (PU/PD).

Uso en gestación, lactación o parto

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto.

El uso de flumetasona puede inducir aborto en el primer tercio de la gestación.

El uso de flumetasona puede inducir el parto en el tercer tercio de la gestación.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la Flumetasona.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No combinar con Antiinflamatorios No Esteroidales (AINE).

No se recomienda el uso de glucocorticoides en etapas en desarrollo. El uso del producto durante estas etapas debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario responsable.

Tiempo de retiro

Carne: 7 días.

Leche: 3 días.



Control del Dolor

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Ninguno relevante.

Presentación

Solución inyectable.

Frasco con 10 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139

