

Iver-pan® al 1%

Reg. Q-0296-069

ISO 9001

Solución inyectable

Ivermectina 1% (endectoparasitica).

Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina	1 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, porcinos y ovinos: Indicado como endectoparasitica profiláctico y tratamiento para:

Parásitos internos de bovinos y ovinos:

Parásitos gastrointestinales adultos y larvarios: *Bunostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Gaigeria spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Chabertia spp.* y *Trichuris spp.*
Adultos y larvas de los nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria* y *Protostrongylus spp.*

Parásitos internos de porcinos:

Adultos y larvas gastrointestinales *Ascaris spp.*, *Hyostomylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides spp.* y *Trichuris spp.*
Adultos y larvas pulmonares: *Metastrongylus spp.*
Adultos y larvas renales: *Stephanurus dentatus*.

Parásitos externos de bovinos, ovinos y cerdos:

Piojos: *Haematopinus eurysternus*, *H. suis*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus* y *Bovicola – Damalinia – bovis*.
Ácaros productores de sarna: *Psoroptes spp.*, *Sarcoptes spp.*, *Chorioptes bovis*.

Administración y Dosis

Vía SC.

Dosis sugerida:

Especies	Dosis	
	mg/ kg p.v.	ml
Bovinos productores de carne y leche	0.2 mg	1 ml/ 50 kg p.v.
Porcinos	0.3 mg	1 ml/ 33 kg p.v.
Ovinos	0.2 mg	0.5 ml/ 25 kg p.v.

Desparasitantes

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda una sola administración cada 15 a 30 días.

Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación
Bovinos productores de carne y ovinos	10 ml	500 kg p.v.
	500 ml	25,000 kg p.v.
Porcinos	10 ml	330 kg p.v.
	500 ml	16,500 kg p.v.

Propiedades farmacológicas

Iver-pan® al 1% contiene Ivermectina el cual es una endectoparasitica de amplio espectro de la familia de las avermectinas.

Actúa afectando la neurotransmisión del impulso neuromuscular de los parásitos al bloquear el neurotransmisor gama-amino-butírico (GABA) lo que provoca la parálisis del parásito y eventualmente la muerte del mismo.

Se metaboliza a nivel hepático en un 50%. Es eliminado vía renal y biliar.

Después de la aplicación es identificable en tejidos hasta 14 días en bovinos, 5 días en ovinos y 7 días en porcinos, particularmente en hígado, grasa corporal, riñones y músculo.

Efectos secundarios y advertencias

Se puede presentar ligero edema y dolor transitorio en la zona de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

Uso en gestación, lactación o parto

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la Ivermectina.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar en ganado productor de leche durante la producción láctea.

No administrar por otra vía que no sea SC.

Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Boophilus spp.*

Tiempo de retiro

Carne: 28 días.

Leche: No se recomienda su uso durante la producción láctea.

Iver-pan® al 1%

PANAVET®
Salud Animal



Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario.

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario.

Desparasitantes

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

La Ivermectina libre puede afectar peces y ciertos organismos acuáticos, por lo tanto, se debe evitar que sobrantes del producto entren en contacto con este hábitat, enterrando o destruyendo los envases por incineración

Presentaciones

Solución inyectable.

Frascos con 10 y 500 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.

Iver-pan® al 1%

PANAVET
Salud Animal

