

Viogel®

Reg. Q-0296-001

ISO 9001

Solución tópica

Antiséptico, desinfectante y auxiliar de la cicatrización.

Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Cloruro de metil rosanilina (violeta de genciana)	500 mg
Alcohol isopropílico	45 ml
Ácido Tánico al Alcohol	500 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos: Indicado para el tratamiento de heridas superficiales como cicatrizante, desinfectante, repelente de insectos y colorante.

Promueve la rápida cicatrización de las heridas y actúa como desinfectante y antiséptico en heridas causadas por procesos quirúrgicos, castraciones, corte de cordón umbilical, infecciones parasitarias superficiales (gusaneras), descorne, así como eczema, fungosis cutáneas y heridas en general.

Administración y Modo de empleo

Vía Tópica.

Dosis sugerida:

Especies	Modo de empleo
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos	Previa limpieza del área afectada aplicar generosamente 3 veces por día hasta su total curación.

La misma dosis puede repetirse 3 veces al día en función del criterio del Médico Veterinario.

La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# Pacientes por presentación
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos	100 ml ó 1 l	El número de los pacientes atendidos varía en función del tamaño del área afectada y cantidad empleada.

Propiedades farmacológicas

Viogel® contiene cloruro de metil rosanilina el cual es un colorante derivado del trifenilmetano. Inhibe el crecimiento hongos, levaduras y es también activo contra bacilos Gram+. La combinación de alcoholes presentes en Viogel® favorecen fijación de la tintura en la piel, evitando que está sea deslavada fácilmente.

Efectos secundarios y advertencias

Limpiar el área afectada adecuadamente antes de aplicar.
Uso externo únicamente.

Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico Veterinario responsable.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula.
No mezclar con otros medicamentos ni productos.
No cubrir la zona tratada con vendajes ni apósitos.

Tiempo de retiro

No aplica.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Este producto mancha, evite el contacto con la piel y la ropa.
No se almacene o use cerca de una flama.
No se exponga al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

Presentación

Solución tópica.
Envase plástico con aplicador con 100 ml.
Envase plástico con o sin atomizador de 1 l.



Antiséptico

Uso veterinario.
Consulte al Médico Veterinario.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
No superar la dosis recomendada.
Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx
panavet.com.mx
(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres
#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro.
México. C.P. 76139.

Viogel®

PANAVET®
Salud Animal



Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario.

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario.